

Area tematica 13

COMORBILITÀ INFETTIVOLOGICA

13.1

IL MODELLO “TEST AND TREAT” PER L’EPATITE DA HCV NEI SERD

*Insalata M.**

Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL Bari ~ Bari ~ Italy

SCREENING PRECOCE E TERAPIA RAPIDA PER I TOSSICODIPENDENTI

Nel nostro Paese vi sono circa 280.000 pazienti con infezione da HCV ancora da diagnosticare.

146.000 avrebbero contratto l’infezione attraverso l’utilizzo attuale o pregresso di sostanze stupefacenti, circa 81.000 mediante tatuaggi o piercing o trattamenti estetici a rischio, prima o subito dopo la scoperta dell’HCV, e circa 30.000 attraverso la trasmissione sessuale.

Nella regione Puglia a gennaio 2020 si stimava ci fossero circa 30.000 individui (una prevalenza di 0.76%) con infezione cronica da HCV attiva NON ancora trattati.

Circa 20.080 (prevalenza pari allo 0.51%) pazienti con infezione cronica da HCV con uno stadio di fibrosi F0-F3 ancora da diagnosticare, di cui circa 10.190 avrebbero contratto l’infezione attraverso l’utilizzo attuale o pregresso di sostanze stupefacenti, circa 5.600 mediante tatuaggi, piercing o trattamenti estetici a rischio e circa 2.670 attraverso la trasmissione sessuale.

Test rapido per la ricerca di HCV RNA su sangue intero con prelievo capillare DAA Direct Acting Antivirals per 12 settimane

27 = 5% SVR - RISPOSTA VIROLOGICA SOSTENUTA- ERADICAZIONE VIRALE

